Produktinformation

Aktivin® DHH

Alkoholisches Haut- und Händedesinfektionsmittel
2-Propanol 70% (V/V)

RKI
VAH
IHO

Beschreibung/ Eigenschaften:	**Aktivin® DHH** ist ein alkoholisches, parfümfreies Desinfektionsmittel zum Einreiben in die Hände und Haut. Ohne kumulierende Langzeitwirkstoffe oder sonstige Zusatzstoffe, daher sehr hautverträglich.
Stoff- oder Indikationsgruppe:	Desinfektionsmittel
Art der Anwendung:	Zum Auftragen auf die Haut und zur Bereitung von Umschlägen
Anwendungsgebiete:	Hygienische und chirurgische Händedesinfektion. Hautdesinfektion vor einfachen Injektionen und Punktionen peripherer Gefäße, Hautdesinfektion vor Operationen und vor Punktionen von Gelenken, Desinfektion talgdrüsenreicher Haut, Kühlumschläge.
Dosierungsanleitung und Art der Anwendung:	Zur hygienischen Händedesinfektion werden die Hände mit der Lösung eingerieben und 30 Sekunden lang feucht gehalten. Zur chirurgischen Händedesinfektion werden Hände und Unterarme mit der Lösung eingerieben und 5 Minuten* lang feucht gehalten. Zur Desinfektion vor einfachen Injektionen und Punktionen peripherer Gefäße wird die Haut mit der Lösung sorgfältig abgerieben und 15 Sekunden lang feucht gehalten. Zur Desinfektion vor Operationen und vor Punktionen von Gelenken wird die Haut mit der Lösung sorgfältig abgerieben und 1 Minute lang feucht gehalten. Zur Desinfektion von talgdrüsenreicher Haut wird die Haut mit der Lösung sorgfältig abgerieben und 10 Minuten** lang feucht gehalten. Für Kühlumschläge ist die Lösung mit gleichen Teilen Wasser verdünnt anzuwenden. * Gemäß VAH-Zertifikat wurde eine Einwirkzeit von 1,5 Minuten bestätigt. ** Gemäß VAH-Zertifikat wurde eine Einwirzeit von 3 Minuten bestätigt.
Wirkungsspektrum und Einwirkzeiten:	

Wirkungsspektrum und Einwirkzeiten			15s	30s	1min	1,5min	3min
Händedesinfektion							
Anwendungsempfehlung zur hygienischen Händedesinfektion *	EN 1500/ VAH			x			
Anwendungsempfehlung zur chirurgischen Händedesinfektion *	EN 12791/ VAH					x	
Hygienische Händedesinfektion im Seuchenfall gemäß IfSG	RKI/DVV	Wirkungsbereich A		x			
mykobakterizid (M. avium und M. terrae)	EN 14348	niedrige und hohe Belastung		x			
begrenzt viruzid	RKI/DVV/ EN 14476			x			

Banken

Wiesbadener Volksbank
IBAN DE36 5109 0000 0071 5421 06
BIC WIBA DE 5W

Deutsche Bank Wiesbaden
IBAN DE20 5107 0021 0041 9135 00
BIC DEUT DE FF 510

Kontakt

WERO GmbH & Co. KG
Idsteiner Straße 94
D-65232 Taunusstein

Phone +49 (0) 61 28 / 97 57 0
Fax +49 (0) 61 28 / 97 57 50
info@wero.de · www.wero.de

Zertifiziert

DIN EN ISO 9001
ÖKOPROFIT

WERO GmbH & Co. KG · USt-IdNr. DE 111361149 · GLN 40 52677 00000 1 · Steuer-Nr. 00434660002
Handelsregister Wiesbaden HRA 6110 · persönlich haftende Gesellschafterin: WERO Beteiligungs-GmbH, Taunusstein · Handelsregister Wiesbaden HRB 16166 · Geschäftsführer: Sebastian Aubele

Wirkungsspektrum und Einwirkzeiten:

Wirkungsspektrum und Einwirkzeiten			15s	30s	1min	1,5min	3min
Hautantiseptik							
Anwendungsempfehlung zur Hautantiseptik vor Injektionen und Punktionen*	VAH		x				
Anwendungsempfehlung zur Hautantiseptik vor Punktionen von Gelenken, Körperhöhlen und Hohlorganen sowie operativen Eingriffen*	VAH				x		
Anwendungsempfehlung zur Hautantiseptik auf talgdrüsenreicher Haut*	VAH						x

*einschließlich Phase 2 Stufe 1 – und Phase 2 Stufe 2 Tests
(quantitative Suspensionsversuche und praxisnahe Keimträgerversuche)

Ergänzende Prüfergebnisse nach EN			15s	30s	1min
bakterizid	EN 13727	niedrige und hohe Belastung	x		
levurozid (Candida albicans)	EN 13624	niedrige und hohe Belastung	x		
tuberkulozid (M. terrae)	EN 14348	niedrige und hohe Belastung	x		
wirksam gegen Rotaviren	EN 14476	niedrige und hohe Belastung	x		
wirksam gegen Noroviren (MNV)	EN 14476	niedrige uns hohe Belastung			x

Gegenanzeigen:	Nicht zur Desinfektion offener Wunden geeignet.
Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln:	Keine bekannt.
Nebenwirkungen:	Beim Einreiben der Haut können Rötungen und leichtes Brennen auftreten.
Meldung von Nebenwirkungen:	Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht hier angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, D-53175 Bonn (www.bfarm.de) anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.
Wirkstoff:	2-Propanol 70% (V/V). Alkoholische Haut-/Händedesinfektion.
Zusammensetzung:	100 g Lösung enthalten: Wirkstoff: 63,1 g 2-Propanol. sonstige Bestandteile: gereinigtes Wasser
Warnhinweise:	Leicht entzündlich! Von Zündquellen fernhalten! Dicht verschlossen lagern. Bei Verschütten der Lösung sind unverzüglich Maßnahmen gegen Brand und Explosion zu treffen. Geeignete Maßnahmen sind z. B. das Aufnehmen der verschütteten Flüssigkeit mit Wasser, das Lüften des Raumes sowie die Beseitigung von Zündquellen.

Verpackungsgrößen:	150 ml, 250 ml, 500 ml, 1000 ml, 5L
Produktstatus:	Zugelassen nach AMG (Arzneimittelgesetz) in Deutschland. Zul.-Nr. 1599.98.99.
Hersteller/ pharmazeutischer Unternehmer:	Dr. Schumacher GmbH Am Roggenfeld 3, D-34323 Malsfeld Tel.: +49 5664 9496-0 E-Mail: info@schumacher-online.com Homepage: www.schumacher-online.com

Unsere Angaben und Empfehlungen entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und befreien den Abnehmer nicht, die Ware für seinen speziellen Einsatzzweck zu prüfen. Jegliche Haftung für unsere Hinweise ist ausgeschlossen.

Stand: Feb. 2026, V06, Lb

Aktivin DHH Haut/Händedesinfektion
Wirkstoff: 2-Propanol 70% (V/V). Alkoholische Haut-/Händedesinfektion. Zusammensetzung: 100 g Lösung enthalten: Wirkstoff: 63,1 g 2-Propanol. Sonstiger Bestandteil: gereinigtes Wasser. Anwendungsgebiete: Hygienische und chirurgische Händedesinfektion. Hautdesinfektion vor einfachen Injektionen und Punktionen peripherer Gefäße, Hautdesinfektion vor Operationen und vor Punktionen von Gelenken, Desinfektion talgdrüsenreicher Haut, Kühlumschläge. Gegenanzeigen: Nicht zur Desinfektion offener Wunden geeignet. Nebenwirkungen: Beim Einreiben der Haut können Rötungen und leichtes Brennen auftreten. Warnhinweise: Leicht entzündlich! Von Zündquellen fernhalten! Dicht verschlossen lagern. Bei Verschütten der Lösung sind unverzüglich Maßnahmen gegen Brand und Explosion zu treffen. Geeignete Maßnahmen sind z. B. das Aufnehmen der verschütteten Flüssigkeit mit Wasser, das Lüften des Raumes sowie die Beseitigung von Zündquellen. Stand: 02/2022.

Dr. Schumacher GmbH
Am Roggenfeld 3
34323 Malsfeld

Tel. 05664/9496-0
info@schumacher-online.com